

肛門がん レジメン

[肛門がん 5-FU+MMC+RT療法](#)

[肛門がん FP療法 プロイメント版](#)

各レジメン詳細は、以下頁参照

レジメン名	肛門がん 5-FU+MMC+RT療法							
1クールの日数	28日							
適応病名	肛門がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	デキサメタゾン注 生理食塩液		6.6 50	mg ml	15分	点滴注射	Day.1	ルート確保
2	マイトマイシン注 生理食塩液	MMC	10 50	mg/m ² ml	30分	点滴注射	Day.1	抗がん剤
3	5-FU注 生理食塩液	5-FU	4000 500	mg/m ² ml	96時間	点滴注射	Day.1-4	抗がん剤
レジメン登録No.	C210010000							
備考	減量・増量基準等							
	遮光の必要性	<input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	催吐性リスク	<input type="checkbox"/> 高度 <input type="checkbox"/> 中等度 <input checked="" type="checkbox"/> 軽度 <input type="checkbox"/> 最小度						
	内服制吐剤の必要性	<input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> アプレピタントCap (Day より 日間) <input type="checkbox"/> デキサメタゾン錠 (mg/日をDay より 日間)						
	その他前投薬の必要性	<input type="checkbox"/> 必要 () <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	経口抗がん剤併用薬							
その他	・ No.3の5-FU注は総量480mLに調製。							

レジメン名	肛門がん FP療法 プロイメンド版							
1クールの日数	28 日							
適応病名	肛門がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	デキサメタゾン注 生理食塩液		6.6 50	mg mL	15分	点滴注射	Day.1	制吐剤
2	5-FU注 生理食塩液	5-FU	5000 500	mg/m² mL	120時間	点滴注射	Day.1-5	抗がん剤
3	生理食塩液 硫酸マグネシウム補正液		500 20	mL mL	60分	点滴注射	Day.2	ハイドレーション
4	生理食塩液		500	mL	60分	点滴注射	Day.2	ハイドレーション
5	ホスアプレピタント注 生理食塩液		150 100	mg mL	30分	点滴注射	Day.2	制吐剤
6	パロノセトロン注 デキサメタゾン注 生理食塩液		0.75 9.9 100	mg mg mL	30分	点滴注射	Day.2	制吐剤
7	シスプラチン注 生理食塩液	CDDP	100 500	mg/m² mL	120分	点滴注射	Day.2	抗がん剤
8	フロセミド注		20	mg	ショット	側管	Day.1	利尿剤
9	生理食塩液		1000	mL	120分	点滴注射	Day.1	ハイドレーション
レジメン登録No.	C210020000							
	内服制吐剤	<input checked="" type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> アプレピタントCap (Day 1より 3日間) <input checked="" type="checkbox"/> デキサメタゾン錠 (8mg/日をDay 3より 3日間) <input checked="" type="checkbox"/> オランザピン錠(5mgをDay 2より 4日間)						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 () <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	経口抗がん剤併用薬							
	備考	・ No.5の5-FUは総量480mlに調製。						