

胆道がんレジメン    GCS療法  
                             GEM+CDDP療法  
                             GEM単剤療法

各レジメン詳細は、以下頁参照

レジメン名	胆道がん GCS療法							
1クールの日数	14日							
適応病名	胆道がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	生理食塩液 硫酸Mg補正液		500 20	mL mL	60分	点滴注射	Day.1	ハイドレーション
2	パロノセトロン注 デキサメタゾン注 生理食塩液		0.75 6.6 50	mg mg mL	15分	点滴注射	Day.1	制吐剤
3	<b>シスプラチン注</b> 生理食塩液		<b>25</b> 250	<b>mg/m<sup>2</sup></b> mL	60分	点滴注射	Day.1	抗がん剤
4	<b>ゲムシタピン注</b> 生理食塩液		<b>1000</b> 100	<b>mg/m<sup>2</sup></b> mL	30分	点滴注射	Day.1	抗がん剤
5	生理食塩液		500	mL	60分	点滴注射	Day.1	ハイドレーション
レジメン登録No.	C24004000							
	内服制吐剤	<input checked="" type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要 <input checked="" type="checkbox"/> アプレピタントCap (Day 1 より 3 日間)    2回目以降は適宜 <input checked="" type="checkbox"/> デキサメタゾン錠 ( 8 mg/日をDay2 より 3 日間)						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 (                    ) <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	経口抗がん剤併用薬	S-1						
	備考	●S-1 : 80mg/m <sup>2</sup> /日    day1夕食後～day8朝食後内服    以後休薬 ●～1.25m <sup>2</sup> : 80mg/日 ●1.25～1.5m <sup>2</sup> : 100mg/日 ●1.5m <sup>2</sup> ～ : 120mg/日						

レジメン名	胆道がん GEM+CDDP療法							
1クールの日数	21日							
適応病名	胆道がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	生理食塩液 硫酸Mg補正液		500 20	mL mL	60分	点滴注射	Day.1,8	ハイドレーション
2	パロノセトロン注 デキサメタゾン注 生理食塩液		0.75 6.6 50	mg mg mL	15分	点滴注射	Day.1,8	制吐剤
3	<b>シスプラチン注</b> 生理食塩液		<b>25</b> 250	<b>mg/m<sup>2</sup></b> mL	60分	点滴注射	Day.1,8	抗がん剤
4	<b>ゲムシタビン注</b> 生理食塩液		<b>1000</b> 100	<b>mg/m<sup>2</sup></b> mL	30分	点滴注射	Day.1,8	抗がん剤
5	生理食塩液		500	mL	60分	点滴注射	Day.1,8	ハイドレーション
レジメン登録No.	C24001000A							
	内服制吐剤	<input checked="" type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要 <input checked="" type="checkbox"/> アプレピタントCap (Day 1 より 3 日間)    2回目以降は適宜 <input checked="" type="checkbox"/> デキサメタゾン錠 ( 8 mg/日をDay2 より 3 日間)						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 (                    ) <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	経口抗がん剤併用薬							
	備考							

レジメン名	胆道がん GEM療法							
1クールの日数	28日							
適応病名	胆道がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	グラニセトロン注 or デキサメサゾン注 生理食塩液		1.00 1.65-6.6 50	mg mg mL	15分	点滴注射	Day.1,8,1 5	制吐剤
2	<b>ゲムシタピン注</b> 生理食塩液	<b>GEM</b>	<b>1,000</b> 100	<b>mg/m2</b> mL	30分	点滴注射	Day.1,8,1 5	抗がん剤
3	生理食塩液		50	mL	全開	点滴注射	Day.1,8,1 5	フラッシュ用
レジメン登録No.	C240020000-C240023000							
	内服制吐剤	<input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 (                      ) <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	経口抗がん剤併用薬							
	備考							