

## 卵巣がん レジメン

[CBDCA+PTX療法 アプレピタント版](#)

[CBDCA+DTX療法 アプレピタント版](#)

[CPT-11単剤療法 2週毎](#)

[CPT-11単剤療法 毎週](#)

[GEM療法 2投1休](#)

[GEM療法 3投1休](#)

[DTX単剤療法](#)

[リポ化DXR単剤療法](#)

各レジメン詳細は、以下頁参照

レジメン名	卵巣がん CBDCA+PTX療法 アプレピタント版							
1クールの日数	21 日							
適応病名	卵巣がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	デキサメタゾン注 ファモチジン注 d-クロルフェニラミン注 グラニセトロン注		6.6 20 5 1	mg mg mg mg	15分	点滴注射	Day.1	制吐剤 抗アレルギー剤
2	生理食塩液		50	ml	全開	点滴注射	Day.1	フラッシュ用
3	パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	PTX	175 500	mg/m <sup>2</sup> mL	180分	点滴注射	Day.1	抗がん剤
4	カルボプラチン注 生理食塩液	CBDCA	5 500	mg/GFR+25 ml	120分	点滴注射	Day.1	抗がん剤
5	生理食塩液		50	ml	全開	点滴注射	Day.1	フラッシュ用
レジメン登録No.	C56001000A							
	内服制吐剤	<input checked="" type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要						
		<input checked="" type="checkbox"/> アプレピタントCap (Day 1より 3日間)						
		<input checked="" type="checkbox"/> デキサメタゾン錠 (4mg/日をDay 2より 3日間)						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 (    )		<input checked="" type="checkbox"/> 不要				
経口抗がん剤併用薬								
備考								

レジメン名	卵巣がん CBDCA+DTX療法 アプレピタント版							
1クールの日数	21 日							
適応病名	卵巣がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	デキサメタゾン注 グラニセトロン注		6.6 1	mg mg	15分	点滴注射	Day.1	制吐剤
2	<b>ドセタキセル注</b> 5%ブドウ糖液	<b>DTX</b>	<b>70</b> 500	<b>mg/m<sup>2</sup></b> mL	120分	点滴注射	Day.1	抗がん剤
3	<b>カルボプラチン注</b> 生理食塩液	<b>CBDCA</b>	<b>5</b> 500	<b>mg/GFR+25</b> ml	120分	点滴注射	Day.1	抗がん剤
4	生理食塩液		50	ml	全開	点滴注射	Day.1	フラッシュ用
レジメン登録No.	C56002000A							
	内服制吐剤	<input checked="" type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要						
		<input checked="" type="checkbox"/> アプレピタントCap (Day 1より 3日間)						
		<input checked="" type="checkbox"/> デキサメタゾン錠 (4mg/日をDay 2より 3日間)						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 (      )		<input checked="" type="checkbox"/> 不要				
経口抗がん剤併用薬								
備考								

レジメン名	卵巣がん CPT-11 単剤療法 2週毎							
1クールの日数	14 日							
適応病名	卵巣がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	パロノセトロン注 デキサメタゾン注 生理食塩液		0.75 9.9 50	mg mg ml	15分	点滴注射	Day.1	制吐剤
2	<b>イリノテカン注</b> 生理食塩液	<b>CPT-11</b>	<b>150</b> 250	<b>mg/m<sup>2</sup></b> mL	90分	点滴注射	Day.1	抗がん剤
3	生理食塩液		50	mL	全開	点滴注射	Day.1	フラッシュ用
レジメン登録No.	C56003000A							
	内服制吐剤	<input checked="" type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要 <input checked="" type="checkbox"/> デキサメタゾン錠 (8mg/日をDay 2 より 3日間)						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 (       ) <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	経口抗がん剤併用薬							
	備考							

レジメン名	卵巣がん CPT-11 単剤療法 毎週							
1クールの日数	28 日							
適応病名	卵巣がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	パロノセトロン注 デキサメタゾン注 生理食塩液		0.75 9.9 50	mg mg ml	15分	点滴注射	Day.1,8,15	制吐剤
2	<b>イリノテカン注</b> 生理食塩液	<b>CPT-11</b>	<b>100</b> 250	<b>mg/m<sup>2</sup></b> mL	90分	点滴注射	Day.1,8,15	抗がん剤
3	生理食塩液		50	mL	全開	点滴注射	Day.1,8,15	フラッシュ用
レジメン登録No.	C56003100A							
	内服制吐剤	<input checked="" type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要 <input checked="" type="checkbox"/> デキサメタゾン錠 (8mg/日をDay 2 より 3日間)						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 (       ) <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	経口抗がん剤併用薬							
	備考							

レジメン名	卵巣がん GEM療法 2投1休							
1クールの日数	21日							
適応病名	胆道がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	グラニセトロン注		1	mg	15分	点滴注射	Day.1,8	制吐剤
2	<b>ゲムシタビン注</b> 生理食塩液	<b>GEM</b>	<b>1,000</b> 100	<b>mg/m<sup>2</sup></b> mL	30分	点滴注射	Day.1,8	抗がん剤
3	生理食塩液		50	mL	全開	点滴注射	Day.1,8	フラッシュ用
レジメン登録No.	C56004000A							
	内服制吐剤	<input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	経口抗がん剤併用薬							
	備考							

レジメン名	卵巣がん GEM療法 3投1休							
1クールの日数	28日							
適応病名	胆道がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	グラニセトロン注		1	mg	15分	点滴注射	Day.1,8,15	制吐剤
2	<b>ゲムシタビン注</b> 生理食塩液	<b>GEM</b>	<b>1,000</b> 100	<b>mg/m<sup>2</sup></b> mL	30分	点滴注射	Day.1,8,15	抗がん剤
3	生理食塩液		50	mL	全開	点滴注射	Day.1,8,15	フラッシュ用
レジメン登録No.	C56004100A							
	内服制吐剤	<input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 (                    ) <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	経口抗がん剤併用薬							
	備考							

レジメン名	卵巣がん DTX単剤療法							
1クールの日数	21 日							
適応病名	卵巣がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	デキサメタゾン注		3.3	mg	15分	点滴注射	Day.1	制吐剤
	グラニセトロン注		1	mg				
2	<b>ドセタキセル注</b> 5%ブドウ糖液	<b>DTX</b>	<b>70 mg/m<sup>2</sup></b> 250	mL	60分	点滴注射	Day.1	抗がん剤
4	生理食塩液		50	ml	全開	点滴注射	Day.1	フラッシュ用
レジメン登録No.	C56005000A							
	内服制吐剤	<input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
		<input type="checkbox"/> アプレピタントCap (Day 1より 3日間)						
		<input type="checkbox"/> デキサメタゾン錠 (4mg/日をDay 2より 3日間)						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 (    ) <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	経口抗がん剤併用薬							
	備考							

レジメン名	卵巣がん リポ化DXR単剤療法							
1クールの日数	28 日							
適応病名	卵巣がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	デキサメタゾン注 グラニセトロン注		6.6 1	mg mg	15分	点滴注射	Day.1	制吐剤
2	リポソーム化ドキシソルピシン注 5%ブドウ糖液	DTX	50 250	mg/m <sup>2</sup> mL	注意コメント参照	点滴注射	Day.1	抗がん剤
4	生理食塩液		50	ml	全開	点滴注射	Day.1	フラッシュ用
レジメン登録No.	C56005000A							
	内服制吐剤	<input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> アプレピタントCap (Day 1より 3日間) <input type="checkbox"/> デキサメタゾン錠 (4mg/日をDay 2より 3日間)						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 (    ) <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	経口抗がん剤併用薬							
	備考	リポソーム化ドキシソルピシン注の投与速度は、90mg以上投与する場合はブドウ糖500mLで希釈し、1mg/分で実施						