

精巣がん レジメン

[BEP療法 アプレピタント版](#)

[CBDCA単剤療法](#)

各レジメン詳細は、以下頁参照

レジメン名	精巣がん BEP療法 アプレピタント版							
1クールの日数	21 日							
適応病名	精巣がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	硫酸Mg補正液 生理食塩液		20 1000	mL mL	120分	点滴注射	Day.1-5	ハイドレーション
2	グラニセトロン注 デキサメタゾン注 生理食塩液		1 9.9 50	mg mg mL	15分	点滴注射	Day.1-5	制吐剤
3	生理食塩液		50	mL	全開	点滴注射	Day.8,15	フラッシュ用
3	ブレオマイシン注 生理食塩液	BLM	30 50	mg/body mL	30分	点滴注射	Day.1,8,15	抗がん剤
4	エトポシド注 5%ブドウ糖液	VP-16	100 500	mg/m ² mL	60分	点滴注射	Day.1-5	抗がん剤
5	シスプラチン注 生理食塩液	CDDP	20 500	mg/m ² mL	120分	点滴注射	Day.1-5	抗がん剤
7	生理食塩液		1000	mL	120分	点滴注射	Day.1	ハイドレーション
8	生理食塩液		50	mL	全開	点滴注射	Day.8,15	フラッシュ用
レジメン登録No.	C620010000							
	内服制吐剤	<input checked="" type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要 <input checked="" type="checkbox"/> アプレピタントCap (Day 1 より 5 日間) <input type="checkbox"/> デキサメタゾン錠 (8 mg/日をDay 2より 3日間) <input type="checkbox"/> オランザピン錠 (5mg/日をDay 1より 4日間)						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 () <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	経口抗がん剤併用薬							
	備考	・ブレオマイシンの総投与量は300mgまでとする。						

レジメン名	精巣がん CBDCA単剤療法							
1クールの日数	21日							
適応病名	精巣がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	グラニセトロン注 生理食塩液		1 50	mg mL	15分	点滴静注	Day.1	制吐剤
2	カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	CBDCA	7 250	mg/GFR+25 mL	60分	点滴静注	Day.1	抗がん剤
3	生理食塩液		50	mL	全開	点滴静注	Day.1	フラッシュ用
レジメン登録No.	C620020000							
備考	減量・増量基準等							
	遮光の必要性	<input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	催吐性リスク	<input checked="" type="checkbox"/> 高度 <input type="checkbox"/> 中等度 <input type="checkbox"/> 軽度 <input type="checkbox"/> 最小度						
	内服制吐剤の必要性	<input type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要 <input checked="" type="checkbox"/> アプレピタントCap (Day 1より 3日間) <input checked="" type="checkbox"/> デキサメタゾン錠 (4mg/日をDay 2より3日間)						
	その他前投薬の必要性	<input type="checkbox"/> 必要 () <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	経口抗がん剤併用薬							
	その他							